

EPILEPTIČKI NAPADAJI BEZ EPILEPSIJE

Epileptički napadaji bez epilepsije mogu se javiti u određenim situacijama kod osoba koje ne boluju od epilepsije. Najčešće su napadaji uzrokovani psihičkim stresom ali mogu biti uzrok i organske bolesti.

Simptomi napada su različiti: nesvjestica, napadaj panike, konvulzije, povišeni tonus, krik, ritmički trzaji ekstremiteta, pad, osjećaj trnjenja, vrtoglavica, osjećaj nelagode u želucu, zbunjenost, promjene emocija i osjetila.

RAZLIKE između NEEPILEPTIČKOG NAPADA i EPI napada:

1. NES se javlja nakon jakog emocionalnog stresa
2. EPI napadaji traju kratko od par sekundi do par minuta nakon čega slijedi faza tjelesne i psihičke iscrpljenosti i do 24 sata. NES može dulje trajati nakon čega slijedi potpuni oporavak.
3. Konvulzije su kod NES-a obično dramatičnije nego kod epileptičkog napada, ali rijetko uzrokuju tjelesne ozljede, dok EPI napadaji mogu prouzročiti i tjelesne ozljede.
4. Gubitak kontrole sfinktera i ugriz jezika češći su kod EPI napadaja, a kod NES-a se javljaju puno rjeđe.
5. NES se češće javlja kod ženskih osoba, gotovo 70%.

Dijagnoza NES-a se postavlja na temelju EEG-a, koji je u tom slučaju uredan. MG i CT se koriste da bi se isključila organska bolest mozga. Također se radi pretraga šećera u krvi i EKG srca što također može uzrokovati napade. Kad se isključe organski uzroci tada se vrši daljnja obrada kod psihijatra i liječenje ide u tom smjeru. U liječenju NES-a najčešće se koristi psihoterapija, a na lijekove iz grupe antiepileptika ne reagira.