


UŠLJIVOST GLAVE- PEDICULOSIS CAPITIS

Ušljivost glave rasprostranjena je širom svijeta.

Njezina pojavnost ne ovisi o socijalnom statusu (pojavljuje se u bogatim i siromašnim sredinama) niti ovisi o higijenskim navikama pojedinca (svakodnevno pranje kose ne štiti od pojave ušljivosti).

Ušljivost se najčešće pojavljuje u djece predškolske i školske dobi te njihovim bliskim kontaktima.

Ušljivost je neugodna, ali uš glave je bezopasan nametnik i ne prenosi nikakve bolesti.



Uš glave je parazit / nametnik veličine 2-3 mm, sive do smeđe boje.

Živi isključivo na vlaštu čovjeka.

Nema ih u zemlji ni u vodi niti na kućnim ljubimcima.


Uš glave se hrani malim obrocima krvi do kojih dolazi bezbolnim ubodima u kožu vlašta pri čemu u ubodnu ranicu unese slinu te dolazi do iritacije i izrazitog svrbeža vlašta.

Češkanjem vlašta mogu nastati inficirane ranice.

Odrasla ženka uši može živjeti 1-2 mjeseca, a dnevno izleže do 10 jajašaca/gnjida.

Gnjide su voštane strukture, bjeličasto-sjajne, čvrsto zalijepljene uz vlas.

Živa uš izvan vlašta može preživjeti 2-3 dana dok gnjida preživljava i do mjesec dana, no razvojni procesi u gnjidi su zaustavljeni (nedostaje temperatura tijela) te se iz nje neće izleći mlada uš/nimfa.



KAKO SE PRENOSE UŠI?

Uši se prenose izravnim dodirom glave o glavu sa osobom koja ima uši, korištenjem zajedničkih češljeva/četki, kapa, marama, ručnika, jastuka, kaciga, kopči za kosu i sl.

Uši ne skaču s čovjeka na čovjeka, ne prenose sa kućnog ljubimca niti preko bazenske vode. Uši samovoljno ne napuštaju vlastište jer im je za preživljavanje nužna temperatura , vлага i obroci krvi.

KAKO PREPOZNATI UŠLJIVOST GLAVE ?

Uporan svrbež glave ukazuje na moguću ušljivost. Detaljnim pregledom vlastišta mogu se uočiti uši koje se brzo kreću ili se nailazi na gnjide, osobito u području zatiljka i iza ušiju. Gnijide se za razliku od peruti teško odstranjuju.

KAKO SE RIJEŠITI UŠLJIVOSTI?

Pristup suzbijanju ušljivosti (individualni ili kolektivni) ovisi o veličini infestacije (broju ušljivih osoba).

1. Na tržištu postoji više vrsta medicinskih pripravaka protiv ušiju. Prije upotrebe nužno je proučiti upute proizvođača.
2. Oprati kosu šamponom protiv ušiju.
3. Kosu češljati gustim češljjem (češalj može biti umočen u otopinu octa ili limuna i vode).
4. Ručno skidati gnjide (temeljito).
5. Postupak pranja ponoviti 2x u prvom tjednu i nakon toga 1x tjedno tako dugo dok na vlastištu više ne budu vidjene gnjide ili žive uši.
6. I nadalje barem 1x tjedno pregledavati vlastište.

7. Postupak se preporuča provesti kod svih članova obitelji / kolektiva (istovremeno).
8. Oprati i prokuhati četke i češljeve (na temperaturi 60 st. C barem 10 minuta).
9. Promijeniti posteljinu, oprati kape i šalove (na temperaturi 60 st. C).
10. Ako se postupak depedikulacije provodi temeljito šišanje kose nije preporučeno.

Nakon uspješno provedenog postupka depedikulacije dijete se može vratiti u kolektiv. Potrebna je liječnička potvrda.

Kod grupiranja ušljivosti u kolektivu svi provode mjeru depedikulacije, potreban je epidemiološki nadzor.

**ZZJZ Međimurske županije
Djelatnost za epidemiologiju**